

(入院・外来) 化学療法治療計画書

発行日 年 月 日

〈治療レジメン名〉 **DTX+HER+パージェタ**

変更 (① / 、② /)

| 薬剤 | 投与量 | 投与方法 | 投与スケジュール |
|-------------|----------------------------------|------|----------|
| DTX(ドセタキセル) | 70 mg/m ² | 点滴 | Day 1 |
| HER(ハーセプチン) | 初回8mg/kg、 2回目以降6mg/kg | 点滴 | Day 1 |
| パージェタ | 初回840mg/body、 2回目以降420mg/body | 点滴 | Day 1 |

外来 科 主治医

患者名 様 ID:

生年月日:(M・T・S・H) 年 月 日(歳) 性別: 男性・女性

身長 cm 体重 kg 体表面積 m² 病名

| No. | 予定時刻 | ルート | 用法 | 薬剤名(規格量) | 指示量 | 施行量 | 所要時間 |
|-----|------|-----|----|------------------------------|------------------------------|-------------|----------------|
| | : | 主管 | 点滴 | 生理食塩液 | 50mL | 1B | ルート確保 |
| ア | : | 主管 | 点滴 | グラニセトロン注バッグ3mg デキサート注 | 100mL 6.6mg | 1B 1V | 30分 |
| イ | : | 主管 | 点滴 | 生理食塩液 パージェタ注 | 250mL 840mg/body | 1B 840mg | 60分 |
| ウ | : | 主管 | 点滴 | 生理食塩液 ハーセプチン注 | 250mL 8mg/kg | 1B mg | 最初はゆっくり 90分 |
| エ | : | 主管 | 点滴 | 生理食塩液 ドセタキセル注「ニプロ」 | 250mL 70mg/m ² | 1B mg | 60分 |
| | : | 主管 | 点滴 | 生理食塩液(ルート確保に用いた残り) | | | |

〈治療開始日〉 年 月 日 〈変更開始日〉② 年 月 日

〈変更開始日〉① 年 月 日 〈変更開始日〉③ 年 月 日

〈投与スケジュール〉 21日で1クール

| Day | 1 | 8 | 15 | 21 |
|-------|---|----|----|----|
| DTX | ↓ | 休薬 | 休薬 | 休薬 |
| HER | ↓ | 休薬 | 休薬 | 休薬 |
| パージェタ | ↓ | 休薬 | 休薬 | 休薬 |

Day1投与、その後Day21まで休薬。

投与翌日(投与終了24時間以降)
ジューラスタ皮下注3.6mg 1筒 皮下注

【注意事項】(同一レジメンを使用する患者全員に対して)

・皮膚に薬剤が付着したときは流水で洗い流す

・前回投与から、6週間以上間隔が開いた場合は、パージェタ注: 840mg/Body、ハーセプチン注: 8mg/kgから再開し、2回目以降はパージェタ注: 420mg/Body、ハーセプチン注: 6mg/kgに減量すること。

【患者個別対応】 あり ・ なし