

## 【入院・外来】化学療法治療計画書

発行日 年 月 日

〈治療レジメン名〉 Weeklyパクリタキセル

変更 (① / 、② / )

薬剤	投与量	投与方法	投与スケジュール
パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴	Day 1. 8. 15

外来 科 主治医

患者名 様 ID:

生年月日:(M・T・S・H) 年 月 日( 歳) 性別: 男性・女性

身長 cm 体重 kg 体表面積 m<sup>2</sup> 病名

No.	予定時刻	ルート	用法	薬剤名(規格量)	指示量	施行量	所要時間
ア	:	経口		レスタミンコーワ錠(10mg)	50mg	5 錠	
	:	主管	点滴	生理食塩液	50mL	1 B	ルート確保
イ	:	主管	点滴	グラニセトロン注バッグ3mg	100mL	1 B	
	:			デキサート注	6.6mg	1 V	
	:			ガスター注(20mg)	20mg	1 A	30分
ウ	:	主管	点滴	生理食塩液	250mL	1 B	
	:			<b>パクリタキセル注「NK」</b>	80mg/m <sup>2</sup>	mg	60分
	:	主管	点滴	生理食塩液(ルート確保に用いた残り)			分

所要時間合計 95分

〈治療開始日〉 年 月 日

〈投与スケジュール〉 28日で1クール 1週毎(3週投薬1週休薬)

Day	1	8	15	21
パクリタキセル	↓	↓	↓	休薬

【注意事項】(同一レジメンを使用する患者全員に対して)

- ・前投薬はパクリタキセル点滴開始30分前に終了しておくこと
- ・バイタルチェック  
パクリタキセル投与
  - ①投与開始時
  - ②3分後
  - ③7分後
  - ④10分後
  - ⑥60分後(終了時)
  - ⑦安静時間終了後
- ・皮膚に薬剤が付着したときは流水で洗い流す
- ・点滴セットはNTG用輸液セットを使用
- ・血管外漏出の無い事を確認し、投与後10分以内は特に嚴重に状態を観察する事
- ・治療終了後1時間経過観察

【患者個別対応】      あり ・ なし