

## 入院化学療法治療計画書

発行日 年 月 日

〈治療レジメン名〉 NDP(アクトラ)+5-FU療法

変更 (① / / ② / / )

薬剤	投与量	投与方法	投与スケジュール
5-FU	800mg/m <sup>2</sup>	持続点滴静注	Day 1~5
NDP(アクトラ)	90mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1

科名 科 主治医

患者名 様 ID:

生年月日:(M・T・S・H) 年 月 日( 歳) 性別: 男性・女性

身長 cm 体重 kg 体表面積 m<sup>2</sup> 病名

## 【Day 1】

No.	予定時刻	ルート	用法	薬剤名(規格量)	指示量	施行量	所要時間
	:	側管	点滴	生理食塩液	50mL	1B	ルート確保
ア	:	側管	点滴	グラニセロン注バッグ3mg デキサート注	100mL 6.6mg	1B 1V	30分
イ	:	主管	持続点滴	生理食塩液 5-FU	500mL 800mg/m <sup>2</sup>	1B mg	24時間
ウ	:	側管	点滴	生理食塩液 アクトラ注	500mL 90mg/m <sup>2</sup>	mL mg	90分
エ	:	側管	点滴	電解質輸液(TPN可) フロセミド注(20mg)	500mL 20mg	1 B 1 A	120分
オ	:	側管	点滴	電解質輸液(TPN可)	500mL	1 B	120分
	:	側管	点滴	生理食塩液 (ルート確保に用いた残り)			

## 【Day2~5】

No.	予定時刻	ルート	用法	薬剤名(規格量)	指示量	施行量	所要時間
ア	:	主管	持続点滴	生理食塩液 5-FU	500mL 800mg/m <sup>2</sup>	1B mg	24時間

〈治療開始日〉 年 月 日

〈投与スケジュール〉 28日(4週)で1クール

Day	1	2	3	4	5	8	15	22
5-FU	↓	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬
NDP	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬

【注意事項】(同一レジメンを使用する患者全員に対して)

例) バイタルをとるタイミング・回数、血管外漏出時の対応(Dr. コール前にする事)

【患者個別対応】(患者個人での注意事項)

例) アレルギー、終了後の安静など